

INSECTICIDA

**Mamboretá**

CONCENTRADO EMULSIONABLE

**Z**

LINEA JARDIN

**Composición:**

lambdacialotrina: (S)-ciano-3-fenoxibencil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (R)-ciano-3-fenoxibencil(Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato..... 5 g  
Solvente y emulsionantes c.s.p..... 100 cm<sup>3</sup>

**PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ÍNTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA ETIQUETA ADJUNTA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**

Inscripto en SENASA N° 00460

Industria Argentina

Fecha de Vencimiento: *Ver en el envase*

Partida N°: *Ver en el envase*

Cont. Neto: *Ver en el envase*

Inflamable de 3ra. categoría

**ARIPA S.R.L.**

Cerrito 1133 (B1714ARC)-Ituzaingo - Pcia.de Bs.As. Argentina

**PRECAUCIONES:** NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. DESTRUYA LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** Evitar la inhalación, el contacto con la piel, la ingestión y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación y aplicación se recomienda usar vestimenta adecuada, guantes, careta, antiparras y botas. No comer, beber o fumar durante la aplicación. No destapar los picos con la boca. No pulverizar contra el viento. Luego de cada aplicación, higienizarse con agua limpia y jabón.

**RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS:** ALTAMENTE TOXICO para ABEJAS. No aplicar en el horario de pecoreo de las abejas. En caso de aplicar, tapar las colmenas (entrada a las piqueras) con arpillera húmeda y goma espuma. Hacer aplicaciones nocturnas o a la mañana temprano.

**AVES:** PRACTICAMENTE NO TOXICO

**PECES:** EXTREMADAMENTE TOXICO para ORGANISMOS ACUATICOS. No aplicar sobre fuentes de agua. Tapar estanques, fuentes, peceras u otros reservorios destinados a la estancia de organismos acuáticos.

**TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Este envase vacío nunca debe ser reutilizado, destruir por rotura o compactación.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar en los envases originales, bien cerrados, en lugares secos, frescos y alejado de los alimentos.

**DERRAMES:** En caso de derrames del producto, cubrir con material absorbente (tierra o arena). Enviar a sitios autorizados para su desposición final

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión. NO PROVOCAR EL VOMITO pues está formulado con solvente, administrar (de ser posible), papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio 30 g.). Por salpicaduras en piel u ojos, enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos. LLAMAR AL MEDICO.

**ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO:** CLASE III - PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO - APLICAR TRATAMIENTO SINTOMATICO.

**SÍNTOMA DE INTOXICACIÓN AGUDA:** mareos, pérdida del conocimiento, dificultades respiratorias, trastornos digestivos, vómitos.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Ciudad de Bs. As.:** Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-2247 / 6666 - Hospital de Clínicas de Buenos Aires - Gral. San Martín: Tel. (011) 5950-8000 - Int. 8004. - **Pcia de Bs. As.:** Centro Nac. de Intoxicaciones, Policlínico Posadas (Haedo): Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777 - **La Plata:** Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/09 - Int. 1312/09 - **Rosario:** Centro de Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727 / 448-0077 - **Córdoba:** Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - **Mendoza:** Hospital Regional: Tel. (0261) 420-0600 / 2653 / 0714 / 4800 - **Neuquén:** Hospital Regional: Tel. (0299) 4413474 / 79 - **Chaco:** Hospital J. C. Perrando: Tel. (03722) 425050 / 427233.

**GENERALIDADES:** Mamboretá Z, a base de lambdacialotrina, actúa sobre las plagas por contacto e ingestión, tiene poder repelente y acción residual. Es de moderada toxicidad para el hombre y animales de sangre caliente, rápida metabolización en caso de ingestión, se descompone rápidamente en el suelo y no es soluble en el agua. Controla insectos masticadores y chupadores. Las plantas y lugares tratados dejan de ser atractivos para los insectos, produciendo un efecto de repelencia. Su uso se recomienda en cultivos forestales, ornamentales, hortícolas y frutales, de acuerdo con lo detallado en la tabla de uso de este folleto.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO:**

Preparación de la emulsión: Mezclar la dosis de Mamboretá Z a utilizar con un poco de agua y agitar hasta formar una emulsión. Luego agregar el agua restante hasta alcanzar el volumen total necesario, pero siempre agitando fuertemente. Utilizar la emulsión de inmediato, no dejar producto preparado de un día para el otro.

**Equipos de aplicación:** En explotaciones reducidas, puede aplicarse con cualquier máquina pulverizadora, sea manual o de motor. Durante la aplicación, deberá mantenerse la emulsión en agitación. Cubrir bien el follaje a tratar, pulverizando hasta punto de goteo. Aplicarlo en las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

Cultivo	Plaga	Dosis* (para 1 litro de agua)	Epoca y Forma de aplicación
<b>FORESTALES ORNAMENTALES</b>	<b>Isocas</b> (Colias sp.)	0,20 cm <sup>3</sup> (3 a 4 gotas)	Aplicar cuando se observen los primeros ataques.
	<b>Gusanos cortadores</b> (Agrotis spp.)		
	<b>Bicho quemador o gata peluda</b> (Hylesia nigricans)	0,15 cm <sup>3</sup> (3 gotas)	Aplicar cuando se observen los ataques.
	<b>Bicho de cesto o canasto</b> (Oiketicus platensis)	0,20 cm <sup>3</sup> (3 a 4 gotas)	Aplicar cuando aparezca la plaga y las larvas son pequeñas.
	<b>Vaquita del olmo</b> (Galerucella luteola)	0,20 cm <sup>3</sup> (3 a 4 gotas)	Aplicar cuando las larvas son pequeñas.
	<b>Chinche verde</b> (Nezara viridula)		Aplicar cuando se observan las primeras chinches
<b>Chicharritas</b> (Dephacidae sp.)	Aplicar cuando se observen los Primeros brotes. Repetir a los 5 días.		
<b>HORTALIZAS</b> Tomate, Berenjena Pimiento	<b>Polilla del tomate</b> (Scrobipalpula absoluta)	0,40 cm <sup>3</sup> (8 gotas)	Tratamientos preventivos cada 20 - 25 días desde el transplante.
Cebolla	<b>Chinche verde</b> (Nezara viridula)	2 cm <sup>3</sup> (40 gotas)	Cuando se observen las primeras chinches.
	<b>Trips</b> (Thrips tabaci)	0,12 cm <sup>3</sup> (3 gotas)	Cuando se observen los primeros ataques.
Arveja	<b>Isoca de la arveja</b> (Helicoverpa zea)	2 cm <sup>3</sup> (40 gotas)	Tratar cuando se observen las primeras larvas. Nota: Con 1 litro cubrir 10 m <sup>2</sup> .
Maíz dulce (Choclo)	<b>Gusanos cortadores</b> (Agrotis spp.)	0,60 - 0,80 cm <sup>3</sup> (12 a 16 gotas)	Aplicar cuando aparezcan las primeras plantas cortadas. Nota: Con 1 litro cubrir 10 m <sup>2</sup> .
<b>FRUTALES</b>	<b>Gusano de la pera y la manzana</b> (Carpocapsa pomonella)	0,15 - 0,20 cm <sup>3</sup> (3 a 4 gotas)	Seguir indicación del Servicio de Alarma o bien cuando caen mariposas en las trampas.
	<b>Bicho de cesto</b> (Oiketicus platensis)	0,20 cm <sup>3</sup> (3 a 4 gotas)	Aplicar cuando aparece la plaga y las larvas son pequeñas.
	<b>Pulgón lanífero</b> (Eriosoma lanigerum)	0,20 cm <sup>3</sup> (3 a 4 gotas)	Aplicar cuando se observen las primeras colonias.
	<b>Psílido del peral</b> (Cacopsyla pyricola)	0,40 cm <sup>3</sup> (8 gotas)	Aplicar cuando se observen ninfas y sea notoria la secreción de la melaza. Repetir a la caída de los pétalos.
Duraznero Damasco Ciruelo Pelón	<b>Gusano del brote del duraznero</b> (Grapholitha molesta)	0,40 cm <sup>3</sup> (8 gotas)	Iniciar los tratamientos a la caída de los pétalos y repetir cada 15 - 20 días. Si hay Servicio de Alarma, seguir las indicaciones.

**Dosificación:** El envase de Mamboretá Z posee gotero dosificador. \* Para dosificar volúmenes mayores de 1 litro de agua, deberá tomar en cuenta estas relaciones de equivalencias:

1 cucharadita de café = 2,50 cm<sup>3</sup> 1 cucharada de postre = 6,50 cm<sup>3</sup>  
1 cucharadita de té = 3,50 cm<sup>3</sup> 1 cucharada sopera = 10 cm<sup>3</sup>

**RESTRICCIONES DE USO:** Intervalo mínimo que debe haber entre la última aplicación y la cosecha de partes comestibles: Alfalfa, duraznero, manzano, nogal, peral y tomate: 1 día. Maíz (dulce): 3 días. Maíz (grano): 5 días. Para florales y ornamentales: no presenta.

**COMPATIBILIDAD:** Mamboretá Z puede mezclarse con la mayoría de los productos insecticidas, acaricidas, herbicidas y fungicidas. Es incompatible con productos de reacción alcalina como Caldo Bordelés y Polisulfuro de Calcio.

**FITOTOXICIDAD:** A las dosis y en los cultivos recomendados, no presenta

**AVISO DE CONSULTA TÉCNICA:** consulte su aplicación con un Ingeniero Agrónomo.

**Importante:** Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervisión directa, ARIPA S.R.L., no se responsabiliza por los daños, accidentes, o resultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto del prescrito en esta etiqueta.

En Huertas  y Jardines


**Mamboretá**

**SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:**

 (011) 4621-7723  +54 11 2389-3821

 info@mamboreta.com.ar

 www.mamboreta.com.ar

 Cerrito 1133 (B1714ARC) - Ituzaingó  
Provincia de Buenos Aires - Argentina



CUIDADO



CUIDADO