



Composición:

tebuconazole: Alfa -[2-(4 clorofenil) etil] -alfa -(1-1 dimetiletil) -1H -1,2,4 triazol -1-etanol 43 g
coadyuvantes y solventes c.s.p 100 cm³



PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA INTEGRAMENTE ESTE FOLLETO Y LA ETIQUETA ADJUNTA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

SENASA N° 00481

Partida N°: Ver en el envase
Industria Argentina
No inflamable

Contenido Neto: Ver en el envase
Fecha de vencimiento: Ver en el envase

ARIPAS R.L.

Cerrito 1133 - (B1714ARC) Ituzaingó - Pcia. de Bs. As. - Argentina

PRECAUCIONES:

NO APLICAR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS - DESTRUYA LOS ENVASES VACIOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel u ojos y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, protector facial, antiparras y ropa de algodón que cubra todo el cuerpo durante el manipuleo y aplicación del producto, finalizada la misma lavarse con abundante agua y jabón. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Para su seguridad después del tratamiento: Higienizarse con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. Lavar los utensilios empleados en la preparación del producto.

RIESGOS AMBIENTALES: Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico. Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura sin contaminar aguas cercanas.

TRATAMIENTO DE ENVASES VACÍOS: proceda a su triple lavado.

METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES: ESTE ENVASE VACIO NUNCA DEBE SER REUTILIZADO. DESTRUIR POR ROTURA O COMPACTACION.

ALMACENAMIENTO: Debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar fresco, ventilado y seguro, cubierto de los rayos solares, lejos del fuego, alimentos y fuera de la casa.

DERRAMES: Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). A continuación, barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso domestico.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión dar de beber mucha agua. No provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: CLASE TOXICOLOGICA IV - PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO.

TOXICIDAD INHALATORIA: CATEGORIA II (NOCIVO). NO IRRITANTE DERMAL LEVE IRRITANTE OCULAR: CATEGORIA IV (CUIDADO). Causa irritación moderada a los ojos. NO SENSIBILIZANTE DERMAL No tiene antidoto específico.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Ciudad de Buenos Aires: Centro Toxicológico del Hospital de Niños de Buenos Aires, Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-2247/6666 - Hospital de Clínicas de Bs. As. - General San Martín: Tel. (011) 5950-8000 Int. 8004 - **Pcia. De Buenos Aires:** Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Posadas (Haedo): Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 - **La Plata:** Hospital de Niños: Tel. (0221) 4535901/ 09 Int. 1312/09 - **Rosario:** Centro de Toxicología TAS: Tel. (0341) 424-2727/448-0077 - **Córdoba:** Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 422-2039 - **Mendoza:** Hospital Regional: Tel. (0261) 420-0600/ 2653/ 0714/ 4800 - **Neuquén:** Hospital Regional: Tel. (0299) 441-3474/ 79 - **Chaco:** Hospital J.C. Ferrando. Tel.(03722) 425050/ 427233.

GENERALIDADES:

Mamboretá FOLI, es un fungicida sistémico, de acción preventiva, curativa y erradicante. Inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo. Posee un amplio espectro de acción destacándose en el control de enfermedades, como fusariosis, septoriosis, royas y oidios, aumentando el rendimiento y calidad de la cosecha.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de la suspensión: Agitar antes de utilizar, mezclar la dosis de **Mamboretá FOLI** utilizar con un poco de agua y agitar hasta formar una emulsión, luego agregar el agua restante hasta alcanzar el volumen total necesario, pero siempre agitando fuertemente. Utilizar la emulsión de inmediato, no dejar producto preparado de un día para el otro. Verificar siempre la fecha de vencimiento del producto.

Equipos de aplicación: En explotaciones reducidas, puede aplicarse con cualquier máquina pulverizadora, sea manual o de motor. Durante la aplicación, deberá mantenerse la suspensión en agitación. Cubrir bien el follaje a tratar, pulverizando hasta punto de goteo. Aplicarlo en las primeras horas de la mañana o últimas de la tarde.

LAVADO DE EQUIPOS

Es importante realizar la limpieza del equipo una vez terminada la aplicación. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales, cultivos o pasturas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Dosificación: El envase **Mamboretá FOLI** posee gotero dosificador.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS * (para 1 litro de agua)	Epoca y Forma de Aplicación
CRISANTEMO ROSAL CLAVEL y PLANTAS ORNAMENTALES	Manchas florales, Royas y Oidios	1 a 2 cm ³ (20 a 40 gotas)	Aplicar al follaje ante la aparición de las primeras manchas.
DURAZNO	Podredumbre morena de los frutales (<i>Monilinia fruticola</i> , <i>Monilinia laxa</i>)	0,3 cm ³ (6 gotas)	Aplicar a los 30 y 15 días antes de la cosecha. En años húmedos, aplicar también en floración. Rotar con otros fungicidas.
MANZANO	Sarna del manzano (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,2 cm ³ (4 gotas)	Aplicar de acuerdo a las condiciones climáticas predisponentes. Rotar o combinar con otros fungicidas.

* Para dosificar volúmenes mayores a 1 litro de agua, deberá tomar en cuenta estas relaciones de equivalencias:

1 cucharadita de café = 2,50 cm³ 1 cucharada de postre = 6,50 cm³
1 cucharadita de té = 3,50 cm³ 1 cucharada sopera = 10 cm³

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y su consumo deberá dejarse transcurrir un tiempo de carencia de 7 días para el DURAZNO y de 35 días para el MANZANO. Para ESPECIES FLORALES y PLANTAS ORNAMENTALES no presenta.

COMPATIBILIDAD: Aunque es preferible aplicarlo solo, **Mamboretá FOLI** es compatible con casi todos los plaguicidas de uso común, salvo con los alcalinos como el caldo bórdeles o el polisulfuro de calcio. En caso de duda, antes de preparar una mezcla en gran escala, es conveniente hacer una pequeña prueba preliminar de compatibilidad. Cuando deba emplearse junto con aceites emulsionables, éstos deberán agregarse a la emulsión luego de haberse logrado la misma.

FITOTOXICIDAD: A las dosis y en los cultivos recomendados, no presenta.

Importante: Por no estar la aplicación ni el almacenamiento bajo su supervisión directa, ARIPA S.R.L., no se responsabiliza por los daños, accidentes, o resultados insatisfactorios que pudieran derivar de un uso incorrecto o distinto del prescrito en esta etiqueta.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: consulte su aplicación con un Ingeniero Agrónomo

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL USUARIO:

-  Tel./Fax: (011) 4621-7723 / 7655
-  E-mail: info@mamboretta.com.ar
-  www.mamboretta.com.ar
-  Cerrito 1133 - (B1714ARC) Ituzaingó
Pcia. de Bs. As. - Argentina - Argentina



CUIDADO



CUIDADO